

CHIRURGISCHE HÄNDEDESINFEKTION

WANN MUSS EINE HÄNDEWASCHUNG VOR DER CHIRURGISCHEN HÄNDEDESINFEKTION DURCHFÜHRT WERDEN?

- Vor der am OP-Tag erstmalig durchgeführten chirurgischen Händedesinfektion, um die Sporenlast zu reduzieren
Achtung: Möglichst Abstand von 10 Minuten zwischen Händewaschung und chirurgischer Händedesinfektion einhalten!
- Bei sichtbarer Verschmutzung



Das Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockene hohle Hand geben.



Zunächst beide Hände und anschließend beide Unterarme jeweils 10 Sekunden bis zum Ellenbogen benetzen.

Hände und Unterarme müssen über die Dauer der deklarierten Einwirkzeit* mit Händedesinfektionsmittel benetzt sein.



Händedesinfektionsphase mittels Einreiben bis zum Ende der Einwirkzeit*. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Fingerkuppen, Nagelfalzen und Fingerzwischenräumen. Auf lückenlose Benetzung achten.



Vor dem Anlegen von OP-Handschuhen sollen die Hände lufttrocken sein.

* Siehe Herstellerangaben