

Pflichttext

Softasept ISO 70% (V/V)

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: *Wirkstoff:* 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. *Sonstige Bestandteile:* Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.

Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise: Pfützenbildung unter dem Patienten vermeiden. Leichtentzündlich! Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen mit Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen von Zündquellen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten mit Wasser spülen.

Stand der Information: 05/2016

Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen